



ที่ ขร ๗๓๕๐๖/๖๐๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ถนนแม่อาว - เชียงราย ขร ๕๗๑๑๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เรียน กำนันตำบลป่าตึง และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้รับแจ้งจากอำเภอแม่จัน ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า กรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย พบว่ามีอุบัติการณ์ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน ๕ ปี ย้อนหลังอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกือบ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) จึงมีโอกาสนี้ในปี ๒๕๖๕ จะเกิดการระบาดมากขึ้น ซึ่งการคาดการณ์ว่าตลอดทั้งปีอาจมีผู้ป่วยสูงถึง ๙,๕๐๐ ราย โดยช่วงไตรมาสแรกของปี มีแนวโน้มพบจำนวนผู้ป่วยประมาณ ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ รายต่อเดือน และเพิ่มสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคม จนถึงที่สุดประมาณ ๑๐,๐๐๐ - ๑๖,๐๐๐ รายต่อเดือนในช่วงฤดูฝน (เดือนมิถุนายน - กันยายน) และพิจารณาพื้นที่ระดับอำเภอเมือง อำเภอที่ตั้งของเทศบาลนคร หรืออำเภอที่มีการระบาดของ โรคไข้เลือดออกซ้ำซากในช่วง ๕ ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีแนวโน้มพบอำเภอเสี่ยงสูงต่อการระบาดทั้งสิ้น จำนวน ๓๐๘ อำเภอ จาก ๙๒๘ อำเภอทั่วประเทศ

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลป่าตึง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและร่วมกันรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

โทร. ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๒ ต่อ ๑๑๕ , โทรสาร. ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๑



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี
มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่



การรักษา



ให้ยาลดไข้ "พาราเซตามอล"
ห้ามใช้แอสไพริน



พยายามดื่มน้ำมากๆ หรือ
ดื่มเกลือแร่แทนน้ำเปล่า



ถ้ามีอาการปวดท้อง ชี้นลง
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น
ไข้ลด ให้รีบนำส่ง รพ. ทันที

อาการ



ไข้สูงเฉียบพลัน
เบื่ออาหาร หน้าแดง
ปวดศีรษะ อาเจียน



มีผื่น จุดสีแดง
ขึ้นตามลำตัว แขน ขา
หรือตามอุ้งจระต่า



มีอาการช็อคช่วงไข้ลด
มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว



ตับโต มักกดเจ็บ
บริเวณชายโครงขวา

การป้องกัน

1. หากมีอาการ
นำส่งสียควรรีบ
พบแพทย์




2. ป้องกันยุงกัด

นอนในมุ้ง หรือติดมุ้งลวด
ในบ้าน และทายากันยุง



3. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง
ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ
และปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบบ้านให้สะอาด





ไข้เลือดออก...ภัยใกล้ตัว

รู้ยัง?

โรคไข้เลือดออก
เกิดจากเชื้อไวรัส
ที่ชื่อว่าเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเป็น
พาหะนำโรค และยุงลาย มักจะวางไข่ใน
แหล่งน้ำใส นิ่ง ในภาชนะที่มีน้ำขัง
รอบบริเวณบ้าน



Z^z

เช็กด่วน

- ✓ มีไข้สูง 2-7 วัน
- ✓ คลื่นไส้ อาเจียน
- ✓ เบื่ออาหาร
- ✓ หน้าแดง
- ✓ อาจพบจุดเลือดที่ผิวหนัง
- ✓ มักจะไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก
- ✓ กกเจ็บชายโครงด้านขวา



รักษายังไง?



ในปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัส โรคไข้เลือดออก
ทำได้เพียงการรักษาตามอาการ หากอาการป่วยของท่าน
คล้ายกับโรคไข้เลือดออก อย่างนั้นนอนใจต้องรีบพบแพทย์ทันที

3ก

เพื่อการปรับเปลี่ยน

เก็บน้ำ

ให้มิดชิดไม่ให้
ยุงลายวางไข่



เก็บบ้าน

ให้ปลอดโปร่ง
ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก



เก็บขยะ

เศษภาชนะไม่ให้
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย





1 ปิดฝา
ภาชนะเก็บน้ำ
ให้มิดชิด

2



เปลี่ยนน้ำ
ในแจกัน
ทุก 7 วัน

3



นอนกางมุ้ง

**สารพัดเคล็ดลับ
รับมือกับยุงลาย**




4

อย่าให้ยุงกัด
สวมเสื้อผาให้มิดชิด
ใช้โลชั่นทาตัว
จุดยากันยุง
ฉีดสเปรย์กำจัดยุง



5



คว่ำภาชนะ
และสิ่งของ
ที่มีน้ำขัง

6



ปล่อยปลา
หางนกยูง
ในอ่างบัว

7




ใช้ทราย
กำจัด
ลูกน้ำยุงลาย

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
รอบบริเวณบ้าน



8

ปฏิบัติทุกข้ออย่าง
สม่ำเสมอ



9